

PATIENT INFORMATION LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Carolina Pharma® Carogil Thyme Extract Syrup

Active Ingredients:

Thyme Extract

Other Ingredients:

Water, Fructose, Citric acid

WHAT IS Carogil Thyme Extract Syrup?

Thyme extract syrup is a natural remedy that is commonly used to relieve respiratory conditions such as coughs, bronchitis, and congestion. It is made from thyme, which contains compounds that have anti-inflammatory and antimicrobial properties.

BEFORE YOU TAKE Carogil Thyme Extract Syrup:

The recommended dosage and frequency of use may vary depending on the individual and the severity of the respiratory condition. It is important to follow the instructions provided by a healthcare provider or on the product label.

Thyme extract syrup should not be used as a substitute for medical treatment for serious respiratory conditions. People with allergies to thyme or other members of the mint family may be at increased risk of an allergic reaction. It is important to consult with a healthcare provider before using thyme extract syrup if you are pregnant or breastfeeding.

DIRECTIONS AND DOSAGE:

Adults and children over 12 years old: Take 5 ml (1 teaspoon) of thyme extract syrup, 3 times a day.

PATIENT INFORMATION LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

The syrup should be taken orally, in the form of a liquid solution.

Children under 12 years old: The dosage may vary depending on the age and weight of the child. It is important to follow the instructions provided by a healthcare provider or on the product label.

Thyme extract syrup should be taken in small, frequent sips. It is important to shake the bottle well before use, and to measure the dosage accurately using a measuring spoon or cup. Thyme extract syrup is typically taken for a short period of time, usually for a few days to a week, depending on the severity of the respiratory condition.

It is always best to consult with a healthcare provider before using thyme extract syrup,

especially if you have any pre-existing medical conditions or are taking any medications.

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

Thyme extract syrup is generally well-tolerated, and serious side effects are rare. However, some people may experience allergic reactions, such as hives, difficulty breathing, or swelling of the face, lips, tongue, or throat.

If you experience any adverse effects while using thyme extract syrup, or if your symptoms do not improve after a few days of treatment, you should contact your healthcare provider for further evaluation and advice.

STORAGE:

To store thyme extract syrup, you should keep it in a cool, dry place, away from direct sunlight and

PATIENT INFORMATION LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

heat. The product should be kept out of the reach of children and should not be used after the expiry date.

If you have any questions or concerns about using thyme extract syrup, please consult your healthcare provider.

FURTHER INFORMATION:

Questions?

Call or WhatsApp:

+1 984-207-4925

Email:

feedback@carolina-pharma.com

Marketing Authorization Holder (MAH):

Carolina Pharma USA, 10540 Ligon Mill Rd, Wake Forest, NC 27587, United States

Manufacturer:

CAROLİNA PHARMA İLAÇVE

KİM.MAD.SAN.TİC. LTD.ŞTİ KARADUVAR

MAH.SERBEST BÖLGE 11. CADDE NO:24 AKDENİZ/
MERSİN

PATIENT INFORMATION LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

كاروجيل شراب خلاصة الزعتر من كارولينا فارما ©

المادة الفعالة:

خلاصة الزعتر

السواغات:

الماء المُنقّى، حمض الليمون، شراب الفركتوز.

ما هو شراب كاروجيل من كارولينا فارما ©؟

شراب مستخلص الزعتر علاج طبيعي يستخدم عادة للتخفيف من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الشعب الهوائية والاحتقان. وهو مصنوع من الزعتر الذي يحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

نصائح قبل استعمال شراب كاروجيل من كارولينا فارما ©

قد تختلف الجرعة الموصى بها وتكرار الاستخدام حسب الشخص وشدة حالة الجهاز التنفسي. من المهم اتباع التعليمات التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية أو على ملصق المنتج.

يجب عدم استخدام شراب مستخلص الزعتر كبديل للعلاج الطبي لأمراض الجهاز التنفسي الخطيرة. قد يكون الأشخاص المصابون بالحساسية تجاه الزعتر أو غيره من أفراد عائلة النعناع أكثر عرضة لخطر الإصابة برد فعل تحسسي. من المهم استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام شراب مستخلص الزعتر إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

التعليمات والجرعة:

- البالغون والأطفال فوق 12 عاماً: تناول 5 مل (1 ملعقة صغيرة) من شراب خلاصة الزعتر 3 مرات يوميًا. يجب تناول الشراب عن طريق الفم، على شكل محلول سائل.

- الأطفال أقل من 12 سنة: قد تختلف الجرعة حسب عمر ووزن الطفل. من المهم اتباع التعليمات التي يقدمها مقدم الرعاية الصحية أو على ملصق المنتج.

يجب تناول شراب مستخلص الزعتر في رشفات صغيرة ومتكررة. من المهم رج الزجاجات جيدًا قبل الاستخدام ، وقياس الجرعة بدقة باستخدام ملعقة أو كوب قياس. عادة ما يتم تناول شراب مستخلص الزعتر لفترة قصيرة من الوقت ، عادة من بضعة أيام إلى أسبوع ، اعتمادًا على شدة حالة الجهاز التنفسي.

PATIENT INFORMATION LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

أو البريد الإلكتروني:

feedback@carolina-pharma.com

الموزع المعتمد:

شركة كارولينا فارما – الولايات المتحدة الأمريكية.

Carolina Pharma USA, 10540
Ligon Mill Rd, Wake Forest, NC
27587, United States

الشركة الصانعة وصاحبة الترخيص:

شركة كارولينا فارما للصناعات الدوائية

CAROLINA PHARMA İLAÇVE
KİM.MAD.SAN.TİC. LTD.ŞTİ Kİ
RADUVAR MAH.SERBEST
BÖLGE 11. CADDE NO:24 AKDE
NİZ/ MERSİN

الحفظ والتخزين:

لتخزين شراب مستخلص الزعر ، يجب حفظه في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة. يجب إبقاء المنتج بعيداً عن متناول الأطفال ويجب عدم استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن استخدام شراب مستخلص الزعر ، فيرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

معلومات إضافية:

لا تترددوا بالاتصال معنا هاتفياً أو عبر تطبيق الواتساب في حال كان لديكم أي سؤال أو استفسار عن هذا المنتج أو غيره من منتجاتنا على الرقم التالي:

+1 984-207-4925

من الأفضل دائماً استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام شراب مستخلص الزعر ، خاصةً إذا كان لديك أي حالات طبية موجودة مسبقاً أو كنت تتناول أي أدوية.

الآثار الجانبية المحتملة:

شراب مستخلص الزعر جيد التحمل بشكل عام ، والآثار الجانبية الخطيرة نادرة. ومع ذلك ، قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية ، مثل خلايا النحل أو صعوبة التنفس أو تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.

إذا واجهت أي آثار ضارة أثناء استخدام شراب مستخلص الزعر ، أو إذا لم تتحسن الأعراض بعد بضعة أيام من العلاج ، يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمزيد من التقييم والمشورة.